

Nervidine®

Erityisravinto hermostuneille hevosille

Koostumus: Erityisravinto hermostuneille hevosille perustuen kasveihin, mineraaleihin ja hivenaineisiin: Pyöröliuskaorapihlaja (Crataegus oxyantha, Sitruunamelissa (Melissa officinalis), Humala (Humulus lupulus) ja Kalifornian tuliunikko (Eschscholtzia californica), magnesiumum, pii.

Ominaisuudet: Nervidine on erityisravinto vähentämään stressireaktioita hevosilla aiheuttamatta uneliaisuutta, tai heikentämättä keskittymiskykyä.

Indikaatio: Tapauksissa, joissa heikko suoritus johtuu
- jännittämisestä
- hermostuneisuudesta
- pelokkuudesta ja ahdistuneisuudesta

Nervidine'ä suositellaan käytettäväksi mm. kuljetusten yhteydessä, olosuhteiden muutosten yhteydessä, ennen suorituksia ja niiden yhteydessä. Nervidine ei ole lääke eikä sillä ole väsyttävää vaikutusta. Nervidine ei ole dopingaine. Huom! Suomessa on suositeltu varoaika 96 tuntia ennen suoritusta.

Annostus ja antotapa: 2,5 ml tai puoli annoslusikallista kahdesti päivässä.(*)

Annostele Nervidine puhtaana tai laimennettuna pieneen vesimäärään mieluiten suoraan hevosen suuhun. Tarvittaessa voidaan sekoittaa rehuun.

Maksimaalisen tehon saavuttamiseksi, Nervidine annetaan muutaman päivän ajan ennen tapahtumaa, kuitenkin vähintään 12 tuntia ennen suunniteltua suoritusta.

Jos kyseessä on voimakas pelokkuus tai stressi, suotellaan käytettäväksi 10 ml Nervidine'ä 18 tuntia ja 6 tuntia ennen suoritusta tai tapahtumaa.

Harjoittelun ja koulutuksen aikana Nervidineä voidaan käyttää 3 ml päivässä pidemmän aikajakson ajan.

Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä.

(*) Tarkoituksen mukainen annos on pyrittävä mukauttamaan tavoitellun vaikutuksen ja eläimen herkkyyden mukaisesti.

Analyysi: Katso koostumus pakkauksesta.

Säilyvyys: 2 vuotta viileässä ja valolta suojattuna.

Pakkaus: 150 ml, sisältäen annostelusikan 5 ml.

Myynti: Hevosklinikat, eläinlääkärit



Maahantuonti ja markkinointi:

eQ-Kemppi
Talttakuja 4
01650 Vantaa
puh 050 3017760
www.eq-kemppi.fi



Valmistaja:

Oystershell nv
Booiebos 24
B-9031 Drogen, Belgia
www.oystershell.com

Nervidine®



I Finland:

Specialnäring för nervösa hästar

Nervidine® är ett specialnäring, som minskar hästarnas stressreaktioner med hjälp av magnesium och växtextrakt.

Sammansättning: Vatten, propylenglykol, magnesiumacetat, etylalkohol, växtbaserade biprodukter (Humulus lupulus, Crataegus oxyacantha, Eschscholtzia californica, Melissa officinalis).

Näringsämnessammansättning:

Fukt	87,72 %	Råaska	3,30 %
Magnesium	1,96 %	Råfett	0,32 %
Råprotein	0,24 %	Råfiber	-

Dosering: Dosera 2,5 ml (1/2 doseringssked) två gånger om dagen, helst direkt i munnen – antingen som sådant eller utspätt med vatten. Bör doseras flera dagar för en stressande händelse. 96 timmars karenstid rekommenderas. Rekommenderas att veterinärutlåtande begärs före användningen.

Rekommenderad användningstid: 2–4 veckor. Omskakas väl före användning.

Preparatet skall inte användas under tiden för dräktighet och digivning.

Tillslut flaskan omsorgsfullt efter användning.

Tillverkat 60 månader före angivet bäst före-datum.

Förvaring: Bör förvaras svalt och skyddat mot ljus. Förvaras oåtkomligt för små barn.

Nettovolym: 150 ml (doseringsskedens storlek 5 ml).



Ergänzungsfutter für Pferde

Nervidine® ist ein Ergänzungsfutter für Pferde zur Minderung von Stressreaktionen.

Zusammensetzung: Wasser, Propylenglykol, Magnesium (als Magnesiumacetat), Ethylalkohol, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Humulus lupulus, Crataegus oxyacantha, Eschscholtzia californica, Melissa officinalis).

Inhaltsstoffe:

Wasser	87,72 %	Rohasche	3,30 %
Magnesium	1,96 %	Rohfett	0,32 %
Rohprotein	0,24 %	Rohfaser	-

Fütterungsanleitung: 2,5 ml (1/2 Dosierlöffel) 2 x täglich am besten direkt in das Maul geben. Die Nervidine® Lösung kann unverdünnt oder mit Wasser verdünnt verabreicht werden.

Über mehrere Tage mindestens 12 Stunden vor der zu erwartenden Stressbelastung verabreichen.

Vor Anwendung Flasche gut schütteln. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Fachmannes einzuholen. Empfohlene Fütterungsdauer: 2 bis 4 Wochen.

Nicht gebrauchen während der Tragezeit und das Säugen.

Flasche nach Gebrauch gut schließen.

Produziert: 60 Monate bevor den angeordneten Mindesthaltbarkeitsdaten.

Lagerung: Kühl und vor Licht geschützt lagern.

Ausser Bereich von jungen Kindern aufbewahren.

Nettovolumen: 150 ml (mit 5 ml-Dosierlöffel).



Complementary feedingstuff for nervous horses

Nervidine® is a complementary feedingstuff for reduction of stress reactions in equines, based on magnesium and plant extracts.

Ingredients: Water, propylene glycol, magnesiumacetate, ethylalcohol, vegetal by-products (Humulus lupulus, Crataegus oxyacantha, Eschscholtzia californica, Melissa officinalis).

Analysis:

Moisture	87,72 %	Crude ash	3,30 %
Magnesium	1,96 %	Crude fat	0,32 %
Crude protein	0,24 %	Crude fiber	-

Administration: 2,5 ml (1/2 dosage spoon) should be administered twice daily, preferably directly into the mouth - either as it is, or diluted with a little water. Administer several days beforehand, with a minimum of 12 hours prior to the event. Shake well before use. It is recommended to consult your vet before use.

Recommended term of use: 2 to 4 weeks.

Do not use during the gestation and lactation period.

Make sure the bottle is well closed after use.

Produced 60 months before the indicated date of minimum stability.

Conservation: Store in a cool and dark place.

Keep away from young children.

Nett volume: 150 ml (with dosage spoon of 5 ml).



eQ-Kemppi
Talttakuja 4
FI-01650 Vantaa
tel. 050 301 7760
www.eq-kemppi.fi

Oystershell nv
Booiebos 24
B-9031 Drogen Belgia
www.oystershell.com